

Peine mono

Apeiba aspera

CONDICIONES DE ADAPTACIÓN

Altitud: 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. **Clima:** Temperatura media de 28 °C, precipitación entre 2.000 y 8.000 mm **Suelos:** Requiere de suelos profundos con drenaje moderado, prefiere suelos arcillosos o franco arcillosos, soporta suelos ácidos de baja fertilidad. **Topografía:** plana o colinas. **Limitantes:** No resiste el ataque de parásitos (*Lorantanaceae*). Es susceptible a las sequías prolongadas y suelos con exceso de drenaje.

MANEJO DE LA SEMILLA

Almacenamiento: Se almacena en frío con un contenido de humedad menor del 10%. **Tratamiento pregerminativo:** Lijar las semillas vigorosamente y dejar en remojo 24 horas. **Plántulas en vivero:** Plántulas reales promedio por kilogramo de semilla: mínimo 20.000. La germinación se inicia a los 7 días y culmina a los 28.

PRODUCCIÓN EN VIVERO

- Utilice la semilla inmediatamente, no la exponga al calor, sol o humedad conserve la identificación.
- Aplique el tratamiento pregerminativo indicado es obligatorio.
- Sustrato de germinación: Para cantidades pequeñas se recomienda Turba para evitar la desinfección; en cantidades mayores se prepara un sustrato de una (1) parte de tierra por tres (3) de arena. No use fertilizantes, gallinaza ni humus para la germinación.
- Desinfección del sustrato: Formol: Un (1) litro por metro cuadrado al 20% de concentración o Basamid 50 g por m² aplicado con el sustrato húmedo; en ambos casos se cubre 4 días con un plástico, luego se remueve por 3 días o más hasta que desaparezca el olor. La profundidad del sustrato no debe ser mayor de 15 cm
- Siembre tan superficial como sea posible, sin que la semilla quede expuesta al aire o la destape el riego.
- Riego: Mantenga húmedo el sustrato durante la germinación, sin exceso o deficiencia de agua, utilice implementos de gota muy fina o nebulización para que no se destape la semilla.
- Proteja la germinación de las condiciones del medio como lluvias fuertes, exceso de sol o calor, roedores o pájaros; el uso opcional de sombra moderada, mejora las condiciones de germinación. Para optimizar la germinación y disminuir la dependencia del riego y a la vez proteger de los cambios ambientales o la desecación prematura del sustrato, una vez realizada la siembra, es conveniente cubrir las eras de germinación con una lona de polipropileno color verde del tipo usado en las construcciones; esta lona permeable se coloca sobre el germinador inmediatamente después de la siembra y se deja hasta que se inicie la germinación. El riego se puede aplicar por encima de la lona. La práctica es sencilla, económica y muy beneficiosa para la producción.
- En todos los casos se deben proteger los germinadores de la lluvia directa para evitar encharcamientos y aparición de problemas sanitarios, se recomienda el uso de plásticos translúcidos al menos a 80 cm de altura, las polisombras no son efectivas debido a que dejan pasar el agua de la lluvia.

Trasplante

Una vez las plantas tienen 2 – 8 cm, se procede a trasplantarlas a bolsas y se siguen las siguientes actividades:

- Se coordina el llenado de bolsas con tierra fértil y cascarilla en una proporción del 20%, se establece una malla sombra mínimo del 65%, indispensable para el trasplante.

- Para el trasplante, se extraen las plántulas una a una protegiendo la raíz del aire y del sol, se pueden colocar en un balde con agua fresca, sumergida únicamente la raíz, se toman una a una sin presionar el tallo ni la raíz, y se colocan en un hoyo hecho con una estaca en el centro de la bolsa, (con el sustrato húmedo), con las raíces extendidas hacia abajo y rectas; este es el momento de aplicación de micorrizas, las cuales se colocan en contacto con la raíz aplicando de 5 a 10 g por bolsa. Recipiente para trasladar las plántulas bien protegidas y sombra durante el trasplante. Trasplante: bajo sombra se hace un hoyo profundo y central con el sustrato húmedo y postura de la plántula sin torcer la raíz.
- El trasplante debe hacerse obligatoriamente bajo sombra usando malla sombra o materiales similares, (no debajo de árboles porque entre luz lateralmente), se dejan dos semanas, y luego se exponen lentamente a plena luz para que crezcan y rustifiquen.
- El riego debe hacerse a diario después del trasplante, de preferencia en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde.
- Una vez trasplantadas algunas plántulas, toman un aspecto poco vigoroso, con apariencia deshidratada o agachadas, lo cual es normal los primeros días.
- La última fase de la producción en vivero es la etapa de crecimiento y desarrollo después del trasplante. Este periodo es variable y debe ser lo suficientemente largo, como para que los árboles alcancen una altura entre 12 y 25 cm para llevar a campo.

PLANTACIÓN Y MANEJO SILVICULTURAL

La plantación se guía de acuerdo a las orientaciones del capítulo III, algunas condiciones particulares:

La distancia de siembra debe ser adecuada que permita el desarrollo en diámetro de los árboles y disminuya la bifurcación (hábito muy frecuente en el peine mono), se recomienda utilizar distancias de 3 x 3 a 4 x 4 m. Debido al hábito de la bifurcación, se recomienda realizar una poda a los 5 años de edad de la plantación.

INFLUENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Se ha observado el ataque de parásitos (*Loranthaceae*), las cuales pueden causar consecuencias económicas si no se asume un rápido control.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

Densidad 0.136 g/cm³. Madera liviana, blanda y se endurece después del secado al aire. Color crema pálido a grisáceo y en ocasiones con matices rosados. En madera seca al horno la contracción radial es 2.54% y la tangencial de 4.65%.

USOS PRINCIPALES

- Elaboración de divisiones y enchapados acústicos.
- Bases para puertas, ventanas zócalos, cielos rasos.
- Tableros enlistonados para puertas, revestimientos y machimbres decorativos.