

# Raque, san juanito, campano

## *Vallea stipularis*

### CONDICIONES DE ADAPTACIÓN

**Altitud:** 2.400 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. **Clima:** Temperatura media de 12 a 20°C, lluvia anual: 1.000 a 2.000 mm Poco resistente a heladas. **Suelos:** Tolera suelos poco profundos, con drenaje de regular a algo excesivo, requiere de suelos franco arcillosos y soporta suelos ácidos. **Limitantes:** Altamente sensible a la contaminación urbana, es necesario sembrarlo asociado con especies pioneras.

### MANEJO DE LA SEMILLA

**Almacenamiento:** La semilla es ortodoxa. Almacene con un contenido de humedad menor del 10% y use empaques herméticos en cuartos fríos, o sitios frescos y bien ventilados. **Tratamiento pregerminativo:** Para Inducir la germinación aplique un tratamiento como: 1) Inmersión en agua a temperatura ambiente por 48 horas ó 2) Inmersión en agua a temperatura ambiente por 24 horas.

### PRODUCCIÓN EN VIVERO

- Utilice la semilla inmediatamente, no la exponga al calor, sol o humedad conserve la identificación.
- Aplique el tratamiento pregerminativo indicado es obligatorio.
- Sustrato de germinación: Para cantidades pequeñas se recomienda Turba para evitar la desinfección; en cantidades mayores se prepara un sustrato de una (1) parte de tierra por tres (3) de arena. No use fertilizantes, gallinaza ni humus para la germinación.
- Desinfección del sustrato: Formol: Un (1) litro por metro cuadrado al 20% de concentración o Basamid 50 g por m<sup>2</sup> aplicado con el sustrato húmedo; en ambos casos se cubre 4 días con un plástico, luego se remueve por 3 días o más hasta que desaparezca el olor. La profundidad del sustrato no debe ser mayor de 15 cm.
- Siembre tan superficial como sea posible, sin que la semilla quede expuesta al aire o la destape el riego.
- Riego: Mantenga húmedo el sustrato durante la germinación, sin exceso o deficiencia de agua, utilice implementos de gota muy fina o nebulización para que no se destape la semilla.
- Proteja la germinación de las condiciones del medio como lluvias fuertes, exceso de sol o calor, roedores o pájaros; el uso opcional de sombra moderada, mejora las condiciones de germinación.

### Trasplante:

Una vez las plantas tienen 2 – 8 cm, se procede a trasplantarlas a bolsas y se siguen las siguientes actividades:

- Se coordina el llenado de bolsas con tierra fértil y cascarilla en una proporción del 20%, se establece una malla sombra mínimo del 65%, indispensable para el trasplante.
- Para el trasplante, se extraen las plántulas una a una protegiendo la raíz del aire y del sol, se pueden colocar en un balde con agua fresca, sumergida únicamente la raíz, se toman una a una sin presionar el tallo ni la raíz, y se colocan en un hoyo hecho con una estaca en el centro de la bolsa, (con el sustrato húmedo), con las raíces extendidas hacia abajo y rectas; este es el momento de aplicación de micorrizas, las cuales se colocan en contacto con la raíz aplicando de 5 a 10 g por bolsa. Recipiente para trasladar las plántulas bien protegidas y sombra durante el trasplante. Trasplante: bajo sombra se hace un hoyo profundo y central con el sustrato húmedo y postura de la plántula sin torcer la raíz.
- El trasplante debe hacerse obligatoriamente bajo sombra usando malla sombra o materiales similares, (no debajo de árboles porque entre luz lateralmente), se dejan dos semanas, y luego se exponen lentamente a plena luz para que crezcan y rustifiquen.

- El riego debe hacerse a diario después del trasplante, de preferencia en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde.
- Una vez trasplantadas algunas plántulas, toman un aspecto poco vigoroso, con apariencia deshidratada o agachadas, lo cual es normal los primeros días.
- La última fase de la producción en vivero es la etapa de crecimiento y desarrollo después del trasplante. Este periodo es variable y debe ser lo suficientemente largo, como para que los árboles alcancen una altura entre 6 y 25 cm para llevar a campo.

#### **USOS PRINCIPALES**

- Madera apta para carpintería
- Leña y carbón.
- En la elaboración de marcos y como poste de cerca.
- Ornamental.
- Producción de miel.